



Permet le contrôle de la population des rats et des souris



Présentation

Bloc prêt à l'emploi, de céréale de haute qualité, imprégné de Diféthialone, **FRAP® BLOCK** est particulièrement résistant à l'humidité et aux moisissures. **FRAP® BLOCK** présente une forte appétence et une efficacité inégalée dans la lutte contre les rats et les souris en intérieur comme en extérieur.

Propriétés

- La Diféthialone est une des substances actives la plus récente et la plus performante sur le marché. Excellente efficacité à faible dose.
- Type «single-feeding» : une seule ingestion suffit. Substance active recommandée pour usage en intérieur et chantiers difficiles (fortes populations de rongeurs, en cas de résistance avérée ou sur la souris au mode alimentaire particulier).
- Présenté en bloc de 25g emballé dans un film perforé, qui laisse diffuser l'odeur céréalière, le bloc **FRAP® BLOCK** conserve son appétence dans le temps. Sa forme étudiée avec plusieurs angles d'attaque permet une meilleure consommation par les rongeurs.

POINTS FORTS

- Blocs imprégnés de Diféthialone
- Action choc à faible dose
- Spécial rongeurs résistants (pas de résistance connue à ce jour)
- Tous lieux
- Fabriqué en France
- Résiste à l'humidité

Réglementation :

Produit biocide : TP14 Produits rodenticides.

AMM n° : FR2012-0499 (Détenant de l'AMM : LIPHATEC).

Matière active : Diféthialone (CAS : 104653-34-1) : 25 mg/kg (0.0025 %).

Cibles : Rats (rats bruns, rats noirs) et Souris (Souris domestiques).

Usages : Intérieur et extérieur (autour des bâtiments).

Antidote : Vitamine K1.

Contient du Bitrex® (marque déposée par Mac Farlan Smith) amérisant réduisant les risques d'intoxication accidentelle.

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, mairies, services entretien, logements collectifs, hôtels, etc.

Mode d'emploi

Bien lire l'étiquette du produit et respecter les instructions d'utilisation.

Éliminer le plus possible les sources de nourriture avant d'appliquer **FRAP® BLOCK**.

Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, disposer le produit au plus près de ces traces.

Appliquer le produit dans des boîtes d'appâtages sécurisées YBO70129 (rats) ou YBO70139 (souris).

	Espèces	Dose autorisée	Distance minimum entre les postes
En intérieur	SOURIS	Poser jusqu'à 50 g par poste d'appâtage	1 mètre
	RATS	Poser jusqu'à 200 g par poste d'appâtage	4 mètres
En extérieur autour des bâtiments	RATS	Poser jusqu'à 200 g par poste d'appâtage	4 mètres

Contrôler régulièrement les appâts et les renouveler jusqu'à extermination des rongeurs.

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anti-coagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

Retirer tous les appâts restants ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

Se laver les mains après toute utilisation / manipulation.

Conditionnement/Sécurité/Stockage

Carton de 12 étuis de 300 g (12 blocs de 25 g).

Réf. : FRA22122.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, s'assurer que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégier chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement.

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas réutiliser les emballages vides. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant les précautions d'usage.

Se conserve 3 ans dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques ou d'élevages.

2105201