

Bloc appât rodenticide prêt à l'emploi **RODIBROD BLOC APPATS**

Phytosanitaires, lutte contre les ravageurs

Chaque bouchée peut être la dernière



Présentation

RODIBROD BLOC APPÂTS est un appât rodenticide en bloc de 20 g conditionné en sachets individuels; Il permet le contrôle des colonies de souris domestiques, rats bruns et rats noirs, à tous les stades de développement.

Le bloc possède un trou central afin d'être fixé fermement aux postes d'appâtage en permettant ainsi de surveiller la consommation des appâts et de réduire la possibilité qu'ils soient déplacés à l'extérieur des postes d'appâtage.



Points forts

- ☒ Efficace contre les rats bruns et noirs et les souris domestiques.
- ☒ Ultra appétant
- ☒ Contient un agent d'amertume
- ☒ Bloc cire 4 saisons

Propriétés

- Substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique le brodifacoum permet le contrôle complet des populations résistantes connues de rongeurs.
- Son mode d'action différée permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie qui continuent à consommer l'appât.
- La formulation offre la combinaison de 5 propriétés spéciales :
 - Un système anti-fusion qui offre un équilibre optimal entre les substances appétentes contenues et une teneur réduite en paraffine pour améliorer la résistance aux hautes températures.
 - Un système de conservateurs qui améliore la résistance du bloc aux moisissures et à la détérioration, le rendant particulièrement adapté à une utilisation dans des conditions humides.
 - Un mélange de trois types de farines pour maximiser l'appétence du bloc.
 - Des multiples arrêtes qui facilitent la consommation de l'appât, grâce à l'aptitude naturelle des rongeurs à ronger.
- Utilisable à l'intérieur et autour des bâtiments ruraux, civils et industriels (y compris les entrepôts, les dépôts, les cales de navires), des maisons, sous-sols, garages, placards. Le produit peut également être utilisé à l'intérieur des installations de distribution d'énergie et dans les moyens de transport.
- Contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

Mode d'emploi

Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés YBO70129 ou YBO70139

Avant la mise en place:

- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple).

- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires).
- Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- **Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.**
- Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau.

Dose et fréquence d'application :

- Contre les souris domestiques (*Mus Musculus*) - Utilisation à l'intérieur : 30-50 grammes d'appât par point d'appât tous les 2-5 mètres.

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

- Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments : 75-100 grammes d'appât par point d'appât tous les 5-10 mètres.

Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : ROD22130

Aspect : Solide

Couleur : verte

Odeur : céréale

Densité : 1.144

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Type de formulation : RB

MA : Brodifacoum (CAS: 56073-10-0): 0.0017% m/m

N° inventaire : FR-2023-0019

Activité : Usage grand public autorisé

TP : TP14 - Produits de lutte contre les rongeurs.

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Bloc 20g en carton de 300g

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit.
- Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.
- FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé :

- dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

- hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

- à distance des denrées alimentaires et boissons destinées à la consommation humaine et animale.

Température de stockage : > 0°C et < 35°C

Durée de stockage conseillée : 24 mois

